

Соняшник та кукурудза без конкурентів

На думку експертів, фаворитами в категорії пізніх ярих культур у 2025 році стануть соняшник та кукурудза: площі під першою культурою втримаються приблизно на минулорічному рівні, під другою – збільшаться. Й така тенденція прогнозовано триматиметься наступні декілька років.

Тож напередодні посівної актуалізується питання захисту цих культур, в першу чергу – на початкових етапах росту та розвитку. Якщо посівний матеріал соняшника та кукурудзи агропромислові купують уже протруєний, то забезпечувати безконкурентне середовище з боку бур'янів – це завдання аграріїв.

Широкорядний у переважній більшості випадків посів соняшника та кукурудзи роблять їх неконкурентоспроможними перед сегетальною рослинністю на ранніх етапах вегетації, – зазначає керівник департаменту агротехнологій [компанії Ukravit](#) Олександр Мигловець. – Тому до фаз, коли вони вже зможуть екранувати міжряддя, їм необхідно забезпечити максимально безконкурентний простір, оскільки цей період для культур є критичним щодо закладання ключових елементів структури майбутньої врожайності. А, оскільки бур'яни є більш пристосованими до несприятливих умов навколишнього природного середовища, зокрема знижених температур, характерних для весни, вони за відсутності якісного ґрунтового захисту розвиваються швидше й споживають призначені культурним рослинам ресурси, чинять на них фітоценотичний тиск, підвищують ризик ураження молодих проростків хворобами та шкідниками. Й нівелювати ці загрози може застосування ефективних ґрунтових гербіцидів».

Для контролю найпоширеніших бур'янів у посівах соняшника та

кукурудзи Олександр рекомендує обрати **Варяг** (метолахлор, 315 г/л + тербутилазин, 190 г/л). Він ефективно контролює амброзію полинолисту, щирицю, підмаренник чіпкий, гірчицю польову, паслін чорний, лободу, талабан польовий, мишій (види), просо куряче та інші.

Метолахлор в його складі відноситься до інгібіторів довголанцюгових жирних кислот. Він практично не переміщується по рослині. Основним місцем поглинання та дії у злакових бур'янах є проростки, у дводольних – коренева система. Діюча речовина абсорбується із верхнього шару ґрунту молодими проростками та корінням, спричиняє загибель бур'янів і запобігає появі їх сходів. Тербутилазин абсорбується як листям, так і корінням і блокує транспорт електронів, що беруть участь у процесі фотосинтезу, як наслідок, відбувається загибель небажаної рослинності.

Варяг має широке «технологічне вікно» застосування – обприскування ґрунту можна проводити до, під час або після сівби культур, але до появи сходів. А на кукурудзі він може застосовуватись у фазі до 5 листків культури. Гербіцид надійно та тривало захищає посіви від широкого спектра однорічних злакових і дводольних видів бур'янів. При цьому він не проявляє фітотоксичності щодо рослин соняшника та кукурудзи, а також повністю розкладається в ґрунті, внаслідок чого відсутні будь-які обмеження в організації сівозміни.