

Фахівець порадив оптимальне рішення для вдалого старту традиційних ярих культур

Щоб **забезпечити** ярим культурам максимально сприятливі умови на початку вегетації, фахівці компанії [Ukravit](#) рекомендують ґрунтовно підходити до вибору базових гербіцидів.

«Ґрунтовий гербіцидний захист – надзвичайно важлива складова технології вирощування ряду культур. Особливо важливий він для кукурудзи, соняшника та сої, оскільки перші дві культури в основному висіваються широкорядним способом, а отже не можуть повноцінно чинити фітоценотичного пресу на бур'яни аж до моменту екранування поверхні ґрунту листовим апаратом», – розповів керівник департаменту агротехнологій Ukravit [Олександр Мигловець](#).

Соя ж, за його словами, характеризується досить тривалим гербокритичним періодом, оскільки росте відносно повільно, особливо за прохолодних умов, і не може конкурувати з бур'яноюю рослинністю за необхідні їй ресурси. Додатково бур'яни є резерватом для комплексу збудників хвороб і шкідників, а також здатні чинити алелопатичний тиск на культури.

Тому внесення ґрунтових гербіцидів може стати одним із головних чинників у отриманні майбутнього врожаю.

Щоб ранні фенофази для ярих культур були безконкурентними з боку бур'янів, Олександр Мигловець рекомендує застосувати бакову суміш [Тізер](#) ([пропізохлор](#), 720 г/л) + [Тернат](#) ([тербутилазин](#), 500 г/л), яка забезпечить контроль

широкого спектра однорічних злакових і дводольних видів сигетальної рослинності.

- Пропізохлор у складі Тізера абсорбується через проростки та кореневу систему бур'янів. Проникаючи через кінчики кореневої системи, діюча речовина швидко призводить до загибелі бур'янів. Вона блокує поділ клітин шляхом інгібіювання синтезу довголанцюгових жирних кислот.
- А діюча речовина гербіциду Тернат абсорбується як листям, так і кореневою системою бур'янів і блокує транспорт електронів, що беруть участь у процесі фотосинтезу (фотосистема II).

Ця бакова композиція захистить кукурудзу, соняшник та сою від поширених однорічних злакових і дводольних видів бур'янів. А внаслідок захисного «екрану», що формується на поверхні ґрунту при обприскуванні, проконтролює появу наступних хвиль сходів бур'янів.

При дотриманні усіх регламентів застосування суміш не проявляє фітотоксичності щодо культурних рослин, а отже, не впливатиме на ріст і розвиток посівів. Тож її застосування – **оптимальне рішення** для вдалого старту традиційних ярих культур.